



## 腸閉塞ってなに?

どんな  
病気?

何らかの原因で腸が動かなくなり、急に嘔吐などが始まる。

腸は、ぜん動運動によって食べ物や水分を送っていますが、何らかの原因でこの働きが止まった状態を腸閉塞といいます。



おもな  
原因

腸がふさがるか、機能不全かの  
2タイプです。

### 腸がふさがり、細くなる 機械的な閉塞

誤飲した異物が原因のことが多いです。ほかに、腸内の腫瘍、特殊な腸炎などによる腸内の腫れ(炎症)、腸の一部が後ろ側に入りこんで重なる腸重積などが原因に。

### 腸の機能が低下する 麻痺性の閉塞

腸管をふさぐ物理的な要因がないのに、腸自体の機能が低下するタイプです。脾炎や腸炎、腹膜炎などの炎症の影響や、開腹手術後の後遺症が原因になります。

おもな  
症状

腸が閉塞した瞬間に  
急激に始まります。

急に強く出たら  
至急  
動物病院へ

時間がたつと  
腸が破れて命に  
かかります!

#### ● 吐き気や嘔吐

(水を飲んでも吐く)

#### ● 食欲不振

#### ● 腹部痛

(背中を丸める、  
体に触るとなったり、  
キャンと鳴いたりする など)

#### ● 脱水

(口の中が乾く、  
つまんだ背中皮膚の戻りが悪い、  
目が落ちくぼんでくる) など

腸閉塞は急激に強く吐く様子が見られることが多いです。原因が腫瘍の場合は、腫瘍の成長度合いによって、症状がだんだんと強くなることもあります。また、唾液や胃液、腸液といった消化液も腸で吸収できなくなり、脱水が進みやすい傾向も。

#### 気をつけたい犬

##### 好奇心旺盛な1才ごろまでの犬

(1〜2才で誤飲しなくなる犬も多いですが、クセとして残る犬もいます)

##### 小型犬 (腸が細いために詰まりやすい)

#### 犬が誤飲して腸に詰まりやすいもの

- ワイヤレスイヤホン
- クッション性のあるプレイマット
- 子ども用のおもちゃ
- 犬のおもちゃ  
(サイズやかたさ、強度が犬に合っていないもの)



検査と  
治療法

画像診断で異物が確認できれば、外科手術で取り除きます。腸が破れたり、血流障害により壊死したりしている場合は、その部分を切り取り腸管同士を接合する手術になります。症状から腸閉塞が疑われるものの、画像検査で確定できないケースでは対症療法で1日様子を見て、再度検査をして判断することも。一方、炎症が原因の腸閉塞では、抗炎症剤や制吐剤、腸の動きをよくする薬を投与する内科療法を行います。



#### 予 防

異物の誤飲による腸閉塞は、環境を整えることで防ぐことができます。犬が届かない場所や扉が閉まる棚にしまったり、フタつきのゴミ箱にしたりなど工夫しましょう。誤飲は成長とともに減りますが、クセとして残る犬もいるので年齢を問わず気をつけて。

いぬに多い病気、そこが知りたい! は「いぬのきもち」で連載中!

●こちらは、掲載した記事を再編集したものです。

アニコム損保ご契約者が  
マイページから定期購読を申込むと  
**2号(2ヶ月分)無料!!**